Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Monozyten im EDTA-Blut

Klinische Indikation

Verdacht auf:

- Leukozytose
- Erkrankungen des Knochenmarks
- Infektionen
- Anämien
- Morbus Pfeiffer
- Monozytenleukämie
- Tuberkulose
- Brucellose
- Malaria
- Morbus Hodgkin
- CML
- maligne Lymphome
- Karzinome

Normalbereiche

International (SI): Einheit in %

	Alter:
2 - 20	bis 2 Wochen
5 - 20	bis 6 Monate
5 - 15	bis 2 Jahre
4 - 10	bis 6 Jahre
4 - 10	bis 12 Jahre
4 - 8	bis 18 Jahre
4 - 12	ab 19 Jahre

Konventionell (KE): Absolutzellzahl in Gpt/l

	Alter:
0 - 3,0	bis 2 Wochen
0 - 3,0	bis 6 Monate
0,4 - 2,0	bis 2 Jahre
0,3 - 1,2	bis 6 Jahre
0,3 - 0,9	bis 12 Jahre
0,4 - 1,3	bis 18 Jahre
0,25 - 0,85	ab 19 Jahre

Sonstiges

Störfaktoren	Gerinnsel
Präanalytik	keine Besonderheiten
Aufbewahrung	2-12h bei Raumtemperatur
Volumen	3,5 ml EDTA-Blut

Literaturhinweise

Lothar Thomas, Labor und Diagnose, 8. Auflage, 2012

Stand: 13.08.2018