Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Noradrenalin im 24 Stunden-Sammelurin angesäuert

Klinische Indikation

- Phäochromozytom
- Neuroblastom
- Ganglioneurom
- arterielle Hypertonie

Normalbereiche

Konventionell (KE): µg/d

< 420	bis 1 Jahre
< 120	bis 4 Jahre
< 90	bis 9 Jahre
< 80	bis 19 Jahre
< 105	ab 20 Jahre

Sonstiges

Methode	HPLC
Kurzbezeichnung	NORAU
Störfaktoren	24 Stunden vor Sammelbeginn des Urins muss auf den Genuss von Bananen, Kaffee, Ananas und Walnüssen verzichtete werden. Die Bestimmung kann nur aus **angesäuertem** 24h-Urin erfolgen. Die entsprechenden Behälter mit Säurezusatz können in unserem Labor bestellt werden. **Mindestens 3 Tage vor Beginn und während des Sammelns** muß auf den Genuß folgender Nahrungsmittel und Getränke verzichtete werden:
Präanalytik	• Nikotin, koffeinhaltige Getränke, Tee, Nüsse, Bananen, Käse, Kakao, Mandeln, Vanille, Zwetschgen, Pflaumen, Tomaten, Stachelbeeren, Ananas, Auberginen, Avocados, Johannisbeeren, Melonen, Mirabellen • Medikamente: mit dem Wirkstoff Paracetamol sollten 2 Tage vorher nicht mehr eingenommen werden, phenothiazinhaltige Medikamente, Antirheumatika (Gentisinsäure- oder Homogentisinsäurehaltige Med.) Urin **gekühlt und lichtgeschützt** lagern!
Aufbewahrung	2 - 8 °C
Häufigkeit der Bestimmung	1 x wöchentlich
Volumen	20 ml 24h-Urin

Stand: 08.04.2024