Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Pankreas-Azinus-Zellen (IgG, IgA) Autoantikörper im Untersuchungsmaterial (verschieden)

Klinische Indikation

Differentialdiagnostik der chronisch-entzündlichen Darmerkankungen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)

Beurteilung

AAk gg. Pankreas-Azinuszellen sind pathognomonisch für Morbus Crohn.

Die Prävalenz der AAk gg. Pankreas-Azinuszellen für Morbus Crohn beträgt ca. 39%, bei Bestehen der Krankheit seit mehr als zwei Jahren 50%.

Bei Colitis ulverosa werden Anti-Pankreas-Azinus-Zellen-Autoantikörper nur in Ausnahmefällen und bei gesunden Probanden praktisch niemals gefunden.

Zur Differenzierung zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa kann mit einer Kombination aus Bestimmung der Anti-Saccharomyces-cerevisiae-Antikörper (ASCA) und Anti-Pankreas-Azinus-Zellen-Autoantikörper eine serologische Trefferquote von 80% für Morbus Crohn erreicht werden.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
`siehe Befundbericht`

Sonstiges

Methode	IFT
Synonyme	CUZD1, GP2
Präanalytik	Bestimmung aus Serum und Plasma möglich
Volumen	2 ml Serum
Fremdleistung	ja

Literaturhinweise

Stöcker et al, Autoantikörper gegen exokrines Pankreas und gegen intestinale Becherzellen in der Diagnostik des Morbus Crohn und der Colitis ulcerosa, Dtsch Med Wochenschr 1984; 109: 1963 - 1969

Stand: 28.03.2018