Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Blutsenkungsreaktion (BSR / BSG) im Blutsenkungsröhrchen

Klinische Indikation

Verdacht auf:

- Entzündungen (Rheumatoide Erkrankungen, Kollagenosen, etc.)
- Tumoren
- Dys- und Paraproteinämie
- Amyloidose

Beurteilung

Die Blutsenkung sollte mit frischem Material unmittelbar nach der Abnahme in der Praxis erfolgen!

Aufgrund der geringen diagnostischen Kriterien der BSR/BSG sollten sensitivere und spezifischere Nachweismethoden (Antikörpernachweise etc.) eingesetzt werden.

Normalbereiche

Konventionell (KE): mm/h

Frauen	
<50 Jahren	<20
>50 Jahre	<30
Männer	
<50 Jahre	<15
>50 Jahre	<20

*Umrechnung: KE = SI * 1*

Sonstiges

Synonyme	Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit, Blutkörperchensenkung
Störfaktoren	Gerinsel, Temperatureinflüße, Pipettierfehler, schräges Einspannen der Röhrchen
Präanalytik	Nach Blutabnahme innerhalb von 2 Stunden durchführen, Medikamente können senkungsblockierend wirken. Blutsenkungsröhrchen verwenden!
Volumen	Spezialröhrchen komplett befüllen

Literaturhinweise

L. Thomas: Labor Diagnose. 8.Auflage

Stand: 17.02.2021

nicht akkreditiertes Verfahre