Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Allgemeine Erreger - Pneumonie im respirator. Sekret

Klinische Indikation

- Rhinitis
- Fieber
- Pharyngitis
- Bronchitis
- Pneumonie
- Laryngotracheitis
- Otitis media

Beurteilung

Häufige Erreger:

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Haemophilus influenzae B*
- *Staphylococcus aureus*
- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*

Atypische Pneumonie-Erreger (Multiplex-PCR Methode nicht akkreditiert):

- Influenza-Virus A, B
- Parainfluenza-Virus Typ 1-4
- Respiratory-Synthitial-Virus A, B
- humanes Metapneumovirus
- Adenovirus
- SARS-CoV-2
- Rhinovirus

Bakterien:

- *Bordetella pertussis / Bordetella parapertussis*
- *Chlamydophila pneumoniae*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Legionella pneumophila*

Pilze:

- Pneumocystis jirovecii

Ggf. Arzt- und Labormeldepflicht beachten (§§ 6, 7 IfSG)!

Sonstiges

Methode	KULT+PCR
Synonyme	Pneumonie

Präanalytik	Entnahmesystem: • steriles Gefäß • eSwab-Abstrichtupfer Alternatives Untersuchungsmaterial: • Sputum • Bronchial-/Trachealsekret • Bronchoalveoläre Lavage (BAL) • Nasen-/Rachenabstrich • Pleurapunktat
Aufbewahrung	Kühlschrank (2 - 8 °C)
Volumen	1 - 5 ml

Stand: 25.09.2023