Leistungsverzeichnis

Eosinophile Granulozyten im EDTA-Blut

Klinische Indikation

Verdacht auf:

- Leukozytose
- Erkrankungen des Knochenmarks
- (parasitäre) Infektionen
- Anämien

Normalbereiche

International (SI): Einheit in %

	bis Alter:
0 - 8	bis 2 Wochen
0 - 5	bis 6 Monate
0 - 4	bis 6 Jahre
0 - 5	bis 12 Jahre
0 - 5	bis 18 Jahre
0,5 - 7	ab 19 Jahre

Konventionell (KE): Absolutzellzahl in Gpt/l

	Alter:
0 - 0,8	bis 2 Wochen
0 - 0,5	bis 6 Monate
0 - 0,3	bis 6 Jahre
0 - 0,4	bis 12 Jahre
0 - 0,3	bis 18 Jahre
0,03 - 0,44	ab 19 Jahre

Sonstiges

Methode	WhF
Störfaktoren	Gerinnsel
Präanalytik	keine Besonderheiten
Aufbewahrung	3 - 12 Stunden bei Raumtemperatur
Volumen	3,5 ml EDTA-Blut

Literaturhinweise

L. Thomas, "Labor und Diagnose" 8. Auflage, 2012

Stand: 13.08.2018