Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Hepatitis A - IgM-Antikörper im Serum

Klinische Indikation

Der Test dient als Hilfsmittel zur Erkennung einer akuten oder kürzlich erworbenen Hepatitis A Virus Infektion. Hepatitis A ist die häufigste Form einer akuten viralen Hepatitis. Die Übertragung erfolgt fäco-oral. Ein chronischer Verlauf sowie die Persistenz sind nicht bekannt.

Beurteilung

Anti-HAV-IgM-AK sind bei Erkrankungsbeginn immer nachweisbar und verschwinden 3-4 Monate später.
Nach einer Impfung werden HAV-IgM-Ak nur sehr selten nachgewiesen.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
`negativ`

Sonstiges

Methode	CLIA
Synonyme	Hepatitis A, HAV
Störfaktoren	Patienten unter hohen Biotin-Dosen, hohe Titer von Ak gegen Strptavidin. Bei Patienten, die mit monoklonalen Maus-Ak therapiert werden, können falsche Ergebnisse auftreten.
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	1 ml Serum

Literaturhinweise

Suerbaum et al, Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 2016, S. 575 - 577

Stand: 09.04.2024