Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Hepatitis C - spezifische Antikörper-Immunoblot (Bestätigungstest) im Serum

Klinische Indikation

Der HCV-Blot wird zur Bestätigung von im Screening Test positiven Proben verwendet.

Beurteilung

Charakteristisch für diese Erkrankung ist eine Inkubationszeit von 2-26 Wochen mit relativ mildem bis fulminantem Verlauf in der akuten Phase. 50-70% entwickeln eine chronische Hepatitis, die in ca. 20% der Fälle zu einer Leberzirrhose führ. Das Risiko ein Leberkarzinom zu entwickeln ist stark erhöht.

Sonstiges

Methode	BLOT
Kurzbezeichnung	HCVBLOT
Synonyme	HCV,Blot,
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	nach Bedarf
Volumen	1 ml Serum

Literaturhinweise

Sarrazin et al, S3-Leitlinie Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-C-Virus (HCV)-Infektion 2016

Suerbaum et al, Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 2016, S. 585 - 588

Stand: 10.04.2024