Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Hepatitis C - Gesamt-Antikörper (IgM + IgG) im Serum

Klinische Indikation

- Verdacht auf eine Hepatitis - C-Infektion
- Übertragung parenteral

Beurteilung

Das Vorhandensein von HCV-Antikörper ist ein Zeichen dafür, das eine Hepatitis C vorliegt (akut oder chronisch) oder durchgemacht wurde.

Bei einem positiven Suchtest erfolgt zur Bestätigung ggf. ein Hepatitis-C-Blot.

Es kann keine Aussage über die Infektiösität getroffen werden - HCV-PCR empfohlen.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
`negativ`

Sonstiges

Methode	ECLIA
Synonyme	HCV, AHCV, Anti-HCV
Störfaktoren	Hämolyse, Lipämie
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	0,5 ml Serum

Literaturhinweise

Sarrazin et al, S3-Leitlinie Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-C-Virus (HCV)-Infektion 2016

Suerbaum et al, Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 2016, S. 585 - 588

Stand: 09.04.2024