Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Harnsäure im Serum

Klinische Indikation

- Stoffwechselstörungen (Gicht, metabolisches Syndrom)
- Niereninsuffizienz
- Leukosen
- Alkohlabusus
- Purin - Stoffwechsel

Beurteilung

Zielwert bei harnsäuresenkender Therapie <360µmol/l (<6mg/dl) lt. aktueller Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie 2016

Normalbereiche

International (SI): µmol/l

143 - 339	Frauen
202 - 416	Männer
< 311	bis 4 Wochen
< 372	bis 1 Jahr
< 362	bis 14 Jahre

Konventionell (KE): mg/dl

2,4 - 5,7	Frauen
3,4 - 7,0	Männer
< 5,23	bis 4 Wochen
< 6,25	bis 1 Jahr
< 6,08	bis 14 Jahre

*Umrechnung: KE = SI * 0,0168*

Sonstiges

Methode	EFT
Kurzbezeichnung	HS
Präanalytik	3 Tage Purin- und Proteinarme Kost, kein Alkohol
Aufbewahrung	im Vollblut bei Raumtemperatur: 7 d; im Serum bei -20°C 6 Monate, bei 4-8°C 7d, bei 20-25°C 3 d
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	1 ml

Stand: 26.04.2024