# Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

## Laktat im Liquor

### *Klinische Indikation*

Stark erhöhte Werte:

- bakterielle Meningitis

Erhöhte Werte:

- virale und tuberkulöse Meningitis (leichte Erhöhung)
- zerebrale Hypoxie, Hirntumor, Hyperventilation, nach OP

DD: intrathekale Blutungen oder artifizielle Blutbeimengung:
Normale Lactat-Werte bei blutigen Liquor sprechen eher für eine artifizielle Blutbeimengung und gegen eine Hirnblutung.

### *Beurteilung*

Für diagnostische Zwecke sollten die Ergebnisse stets im Zusammenhang mit der Anamnese, klinischen Untersuchung und anderen Untersuchungsergebnissen gewertet werden.

### *Normalbereiche*

*International (SI): mmol/l*

| | |
|---|---|
| 1,1 - 2,4 | Erwachsene |
| siehe Befundbericht | Kinder |

*Konventionell (KE): mg/dl*

| | |
|---|---|
| 10,0 - 22,0 | Erwachsene |
| siehe Befundbericht | Kinder |

*Umrechnung: KE = SI * 9,0909*

### *Sonstiges*

| | |
|---|---|
| *Methode* | FT |
| *Synonyme* | Milchsäure |
| *Volumen* | 1 ml Liquor |

Stand: 04.04.2018