Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Lebermembran-Antigen Autoantikörper (LMA) im Serum

Klinische Indikation

- Autoimmune Hepatitis (AIH, ca. 88%)
- Autoimmune Hepatitis Typ 1 (75%)
- Autoimmune Hepatitis Typ 2 (40%)
- Beurteilung der Entzündungsaktivität bei autoimmuner Hepatitis (AIH)
- Therapieüberwachung der AIH
- primär biliäre Zirrhose (14 - 50%)
- akute Virushepatitis (11 - 14%)
- HCV-Infektion (14 - 20%)
- chronische HBV-Infektion (je nach Aktivität bis zu 70%)
- chronische HDV-Infektion (ca. 80%)
- alkoholtoxischer Leberschaden (ca. 8%)
- Schistosomiasis (27%)
- weitere Autoimmunerkrankungen (ca. 5%)
- Lebertumoren (11%)

Normalbereiche

Konventionell (KE): Titer
< 1:100

Sonstiges

Methode	IFT
Kurzbezeichnung	Anti-LMA, ASPG-R-AK
Synonyme	Asialoglykoproteinrezeptor-Autoantikörper, ASPG-R-AK
Präanalytik	keine Besonderheiten
Volumen	1 ml Serum
Fremdleistung	ja

Literaturhinweise

McFarlane et al, Serum autoantibodies reacting with the hepatic asialoglycoprotein receptor protein (hepatic lectin) in acute and chronic liver disorders, J Hepatol 1986; 3: 196 - 205

Stand: 28.03.2018