Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Alpha - Fetoprotein (AFP) im Serum

Klinische Indikation

- V. a. Leberzellkarzinom, Keimzelltumor (Hoden, Ovar, extragonadal)
- Kontrolle von Leberzirrhose-Patienten
- Patienten mit erhöhten Risiko eines Keimzelltumors
- Kontrolle eines Zustandes nach Hodentumor-Operation

Weitere Indikation:

- Risikoabschätzung auf Trisomie 21 (Triple-Test) oder eines Neuralrohrdefekts im zweiten Triminon einer Schwangerschaft

Beurteilung

Erhöhte Werte auch bei benignen Erkrankungen wie Virushepatitis, alkoholbedingte Hepatitis und Leberzirrhose.

AFP-Bestimmung immer nur in Verbindung mit anderen Laborwerten sowie klinischen Informationen verwenden.

Normalbereiche

Konventionell (KE): ng/ml

< 7,0	Allgemein (Erwachsene)
siehe Befundbericht	Schwangerschaft, Kinder

Sonstiges

Methode	CLIA
Kurzbezeichnung	AFP
Störfaktoren	Hämolyse, Lipämie, stark ikterische Proben
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	1 ml Serum

Stand: 11.04.2024