Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Retikulozyten im EDTA-Blut

Klinische Indikation

Abklärung von Anämien und Prüfung der Effektivität der Erythropoese.
Therapieüberwachung bei Substitutionsbehandlung einer Eisenmangelanämie oder Erythropoetintherapie der renalen Anämie.
Überwachung der Knochenmarksfunktion nach einer Chemotherapie.

Normalbereiche

International (SI): ‰

	bis Alter:
30 - 70	bis 1 Tag
10 - 30	bis 3 Tage
1 - 10	bis 1 Woche
2 - 20	bis 1 Monat
3 - 35	bis 6 Wochen
4 - 48	bis 2 Monate
3 - 42	bis 11 Wochen
3 - 36	bis 3 Monate
5 - 18	Allgemein männlich
5 - 22	Allgemein weiblich

Sonstiges

Methode	DFZ
Kurzbezeichnung	RETI
Störfaktoren	Gerinnsel
Präanalytik	Die Untersuchung von zellulären Parametern, wie Form, Farbe und Verteilung, kann schon nach 7 h beeinträchtigt sein.
Aufbewahrung	max. 24 h bei Raumtemperatur stabil
Volumen	3,5 ml EDTA-Blut

Literaturhinweise

Walter G. Guder, Jürgen Nolte (Hrsg.), Das Laborbuch für Klinik und Praxis, 2. Auflage, Urban und Fischer München

nicht akkreditiertes Verfahre

Stand: 05.09.2023