p-ANCA (IFT) im Serum

Klinische Indikation

Nekrotisierende Vaskulitis im Respirationstrakt:

- Mikroskopische Polyangiitis (ca. 60%)
- pauci-immune nekrotisierende Glomerulonephritis (65 - 90%)
- Polyarteriitis nodosa
- Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis (ehemals Churg-Strauss-Syndrom)
- Morbus Crohn (ca. 7%)
- Colitis ulcerosa (ca. 67%)
- primär sklerosierende Cholangitis
- arzneimittelinduzierte Vaskulitis
- sehr selten: systemischer Lupus erythematodes und rheumatoide Arthritis

Normalbereiche

Konventionell (KE): Titer
< 1:10

Sonstiges

Methode	IFT
Synonyme	Anti-Neutrophilen Cytoplasma AK, Anticytoplasma AK, antineutrophile zytoplasmatische Antikörper
Präanalytik	keine Besonderheiten
Volumen	1 ml Serum
Fremdleistung	ja

Literaturhinweise

Diller, Fleck, Labordiagnostik bei systemischen Autoimmunerkrankungen, Lab Med 2016; 40: 97 - 110

Jenette et al, 2012 Revised International Chapel Hill Consensus Conference Nomenclature of Vasculitides, Arthritis & Rheumatism 2013; 65: 1 - 11

Stand: 28.03.2018