Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

KU - Autoantikörper im Serum

Klinische Indikation

- Sklerodermie-Überlappungs-Syndrom (25-50%)
- Polymyositis und DD der Myositis (5 - 10%)
- Sjörgren-Syndrom
- Sklerodermie (ca. 5%)
- SLE - Systematischer Lupus erythematodes (ca. 10%)

Beurteilung

Prävalenz von 20% bei Patienten mit Kollagenosen (SLE, Sklerodermie, Myositis, Sjörgren-Syndrom, Polymyositis / Sklerodermie-Überlappungssyndrom. Die Spezifität dieser Antikörper ist allerdings sehr gering.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
negativ

Sonstiges

Methode	BLOT
Kurzbezeichnung	KU
Synonyme	Ku-Antikörper, Anti-Ku (p70/p80), Anti-Ku (p70/p86)
Störfaktoren	Nur hochtitrige Ku-Ak gegen linear angeordnete Epitope können detektiert werden.
Präanalytik	keine Besonderheiten
Volumen	1 ml Serum
Fremdleistung	ja

Literaturhinweise

Mierau et al, Diagnostische Bedeutung Sklerodermie- und Myositis-assoziierter Autoantikörper, Z Rheumatol 1995; 54: 39 - 49

Stand: 28.03.2018