Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Ma (Ta) - Autoantikörper im Untersuchungsmaterial (verschieden)

Klinische Indikation

Sicherung der paraneoplastischen Ätiologie eines neurologischen Syndroms
Weitere gut charaterisierte onkoneurale Antikörper sind:

- Anti-Hu (ANNA1) Autoantikörper
- Anti-Yo (PCA1) Autoantikörper
- Anti-CV2 (CRMP5) Autoantikörper
- Anti-Ri (ANNA2) Autoantikörper
- Anti-Amphiphysin Autoantikörper

Beurteilung

Anti-Ma-Autoantikörper sind mit Hirnstamm-Enzephalitis und limbischer Enzephalitis assoziiert.
Assoziierte Tumore: Lungenkarzinom, Hodenkarzinom, Mammakarzinom

Normalbereiche

Konventionell (KE): Titer
< 1:10

Sonstiges

Methode	IFT
Synonyme	Margret, Anti-Ma1, Anti-Ma2, Anti-neuronale Antikörper, onkoneurale Antikörper
Präanalytik	Bestimmung aus Serum, Plasma und Liquor möglich (Liquorbestimmung nicht validiert und nicht akkreditiert)
Volumen	1,5 ml Serum
Fremdleistung	ja

Literaturhinweise

Graus et al, Recommended diagnostic criteria for paraneoplastic neurological syndromes, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 1135 - 1140

Stand: 28.03.2018