Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Normetanephrin im 24 Stunden-Sammelurin angesäuert

Klinische Indikation

Diagnose und Therapie von Phäochromocytomen und verwandten neuronalen Tumoren.

Normalbereiche

Konventionell (KE): µg/d

Männer	
18 - 40 Jahre	< 659,5
40 - 60 Jahre	< 778,6
> 60 Jahre	< 824,4
Frauen	
18 - 40 Jahre	< 549,6
40 - 60 Jahre	< 632,0
> 60 Jahre	< 668,7

Sonstiges

Methode HPLC

Synonyme Katecholamine

Präanalytik

Die Bestimmung kann nur aus **angesäuertem** 24h-Urin erfolgen. Die entsprechenden Behälter mit Säurezusatz können in unserem Labor bestellt werden.

Mindestens 3 Tage vor Beginn und während des Sammelns muß auf den Genuß folgender Nahrungsmittel und Getränke verzichtete werden:

- Nikotin, koffeinhaltige Getränke, Tee, Nüsse, Bananen, Käse, Kakao, Mandeln, Vanille, Zwetschgen, Pflaumen, Tomaten, Stachelbeeren, Ananas, Auberginen, Avocados, Johannisbeeren, Melonen, Mirabellen
- Medikamente: mit dem Wirkstoff Paracetamol sollten 2 Tage vorher nicht mehr eingenommen werden, phenothiazinhaltige Medikamente, Antirheumatika (Gentisinsäure- oder Homogentisinsäurehaltige Med.)

Urin **gekühlt und lichtgeschützt** lagern!

Häufigkeit der Bestimmung 1 x wöchentlich

Volumen 20 ml 24h-Urin

Stand: 08.04.2024