Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Faktor II - Aktivität im Citrat-Blut

Klinische Indikation

- bei erniedrigten Quick-Wert unklarer Genese
- Blutungsneigung
- bei pathologischer Prothrombinzeit
- erworbener oder hereditärer Faktor-II-Mangel

Normalbereiche

Konventionell (KE): %

	bis Alter:
25 - 70	bis 1 Tag
35 - 100	bis 1 Monat
60 - 115	bis 6 Monate
70 - 120	ab 7 Monate

Sonstiges

Methode	KOAG
Synonyme	Prothrombin
Störfaktoren	angeronnene Probe, mehrfaches Ein-Ausfrieren, falsches Mischungsverhältnis, Hämolyse
Präanalytik	• kurzer venöser Stau • glatte Punktion • Blutentnahme ohne Stau • sofort schwenken • nicht schütteln • max. präanalytische Zeit 4 Stunden • kühl lagern Citratblut nach Entnahme 30min zentrifugieren, Plasma abtrennen und einfrieren
Aufbewahrung	im Vollblut 4 h; im Plasma bei 25°C 6 h, bei -20°C 1 Monat
Volumen	2 ml Citrat-Blut
Fremdleistung	ja

Stand: 24.07.2018