Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Opiate im Urin

Klinische Indikation

Drogenmissbrauch

Nachweisbarkeitsdauer: 2-3 Tage

Zu den Opiaten gehören: Codein, Dihydrocodein, Heroin (Diamorphin), Morphin u.a.

Beurteilung

Codein, Dihydrocodein: Hemmung des Hustenrefllexes sowie schwache analgetische Wirkung.
Heroin (Diamorphin), Morphin: sedativ, hypnotische, narkotische, atemdepressorische, antitussive, analgetische und euphorisierende Wirkungskomponenten

Der Schwellenwert für diesen Test wurde nach NIDA (National Institut of Drug Abuse - USA) auf 2000 ng/ml eingestellt.

Screeningtest, positive Ergebnisse sollten mittels GC/MS bestätigt werden!

Normalbereiche

Konventionell (KE): ng/ml

< 300	negativ

Sonstiges

Methode	EIA
Kurzbezeichnung	OPIAUQ
Synonyme	Drogen, Betäubungsmittel, Morphinderivate
Präanalytik	Harnproben nur unter Aufsicht asservieren.
Aufbewahrung	2 - 8 °C 2 Tage, längere Zeit -20°C
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich nach Bedarf
Volumen	5 ml

Stand: 12.04.2024