

HIV-(„AIDS“)Test

Ich möchte beim Test anonym bleiben. Ist dies möglich?

Der HIV-(„AIDS“)Test ist auf Ihren Wunsch auch anonym möglich. Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt. Auch bei uns im Labor Prof. Schenk/Dr. Ansorge ist jeden Werktag von 8 – 17 Uhr nach telefonischer Voranmeldung (0391/25 55 30) die Blutentnahme möglich.

Wie lange muss ich auf das Ergebnis für den HIV-(„AIDS“)Test warten?

Spätestens am Folgetag nach der Blutabnahme liegt für den Suchtest Ihr Ergebnis im Labor vor.

Allgemeine Informationen

Einige medizinische Leistungen können von den Krankenkassen nicht mehr in jedem Fall übernommen werden und müssen deshalb vom Patienten selbst bezahlt werden. Ihr Haus- oder Facharzt entscheidet, welche ärztliche Leistung bei Ihnen kurativ erforderlich ist. Für Versicherte der Privaten Krankenversicherung erfolgt eine Kostenübernahme, wenn kein vorheriger Leistungsausschluss bestand. Falls Sie hierzu Fragen haben, wird Ihr Arzt Sie gerne beraten.

Wir bestimmen für Sie:

- AIDS (HIV 1+2)-Test (EIA) im Serum


Stempel der Arztpraxis

Praxis für Labormedizin und Medizinische Mikrobiologie Prof. H. Schenk und Dr. T. Ansorge


Am Neustädter Feld 47
39124 Magdeburg
Tel.: (0391) 25 55 350
Fax: (0391) 25 55 351

www.schenk-ansorge.de

HIV-(„AIDS“)Test



Wenn man sich doch einmal unsicher ist



AIDS oder Schwächung der Immunabwehr

AIDS oder Schwächung der Immunabwehr ist der Name des Krankheitskomplexes, welcher nach Infektion mit dem HI-Virus droht. Es gibt verschiedene Therapieansätze, aber man muss feststellen, dass AIDS bis heute trotz aller medizinischen Fortschritte nicht heilbar ist.

Deshalb hat der Schutz vor Ansteckung nach wie vor den höchsten Stellenwert bei der Bekämpfung der Erkrankung. Wirksamstes Mittel ist die Verwendung des Kondoms. Ungeschützter Geschlechtsverkehr außerhalb einer festen Partnerschaft provoziert neben der HIV-Infektion Geschlechtskrankheiten wie z.B. Gonorrhoe, Hepatitis, Chlamydieninfektionen und Lues.

Wie kann man sich mit HIV infizieren?

Hauptsächliche Übertragungswege sind:

- Ungeschützter Geschlechtsverkehr
- Blutkontakt mit infiziertem Blut

Wenn Sie sich doch einmal unsicher sind, kann durch einen HIV- („AIDS“)-Test mit hoher Sicherheit eine Infektion ausgeschlossen werden.

Wann wird der HIV- („AIDS“) Test nach einer Infektion positiv?

Eine normale Immunantwort des Körpers vorausgesetzt, sind frühestens 4 bis 6 Wochen nach Infektion Antikörper gegen HIV im Blut nachweisbar. Diese ergeben dann im HIV- („AIDS“)Test ein positives Ergebnis. Bei einem sicheren Blutkontakt mit infiziertem Blut (z.B. Nadelverletzung) oder auf Ihren Wunsch kann man mit dem direkten Virusnachweis (HIV-PCR) noch früher eine HIV-Infektion feststellen.

Wie sicher ist der HIV- („AIDS“)Test?

Die modernen Teste haben eine hohe Spezifität. Das heißt, bei einem negativen Testergebnis und normaler Immunantwort des Körpers kann man sich sehr sicher sein, keine Infektion zu haben. Es werden mit dem Test Antikörper gegen die HIV-Typen I und II nachgewiesen.



Was mache ich, wenn mein Test positiv ist?

Bei positivem Testergebnis muss in einer zweiten Blutprobe mit dem Antikörper-Nachweis, dem Bestätigungstest und dem Nachweis der Viruszahl die HIV-Infektion gesichert werden. Die weitere medizinische Betreuung erfolgt dann in speziellen Arztpraxen. Wenn Sie wissen wollen, wo sich diese befinden, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren Hausarzt. Auch im Internet sind Verweise zu finden.