



Blutungsneigung - Stufendiagnostik

Bezeichnung	Blutungsneigung – Stufendiagnostik
Synonym	Hämorrhagische Diathese
Basisdiagnostik	<i>wir benötigen ein Citratblut und ein EDTA-Vollblut</i> Quick Partielle Thromboplastinzeit Thrombinzeit Fibrinogen Thrombozyten
Stufe 2	Blutungsneigung als erweiterte Diagnostik zum Ausschluß einer Hämophilie A, Hämophilie B bzw. eines von Willebrandt-Jürgens-Syndroms: <i>wir benötigen ein Citratblut :</i> Faktor VIII -Aktivität von Willebrand -Faktor Antigen Gerinnungsfaktor-VIII-Ristoc.-Cofaktor (v. Willebrand-Faktor-Aktivität) Faktor IX – Aktivität
Stufe 3	·Aktivitätsbestimmung der anderen Einzelfaktoren (II, V, VII, X, XI, XII, XIII) ·Inhibitordiagnostik (insbesondere Faktor VIII-Inhibitor) <i>wir benötigen zwei Citratblut :</i> Faktor II - Aktivität Faktor V -Aktivität Faktor IX -Aktivität Faktor XII -Aktivität Faktor XIII -Aktivität
Stufe 4	·Thrombozyten-Spezialdiagnostik (ACHTUNG! Spezielle Blutentnahmebedingungen, Vorabsprache erbeten) ·Thrombozytenvolumen ·Verteilungsbreite ·Retention, Ausbreitung und Aggregation

Mit kollegialen Grüßen
Ihr Spezialist für Labormedizin