LABOR Schenk/Ansorge

AAK gg. Mitochondrien (Screening) im Serum

Klinische Indikation

Titer von 1:100 und höher:

- primär biliäre Zirrhose (> 90% M2, 82% M9)
- autoimmune chron. aktive Hepatitis (über 50%)
- medikamenteninduzierte Hepatitis (über 50%)
- andere chron. Lebererkrankungen
- Sklerodermie, CREST- , Sjögren-Syndrom
- akute Myokarditis, Cardiomyopathien

Beurteilung

AMA können bei verschiedenen Erkrankungen nachgewiesen werden, häufig zusammen mit anderen Auto-Ak (z.B.: ANA). Diagnostischen Wert haben neun AMA-Typen (M1-M9). Die Prävalenz der Ak beträgt bis zu 100%.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
`negativ`

Sonstiges

Methode	IIFT
Kurzbezeichnung	AMA
Synonyme	AMA
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	2 x wöchentlich
Volumen	1 ml Serum

Literaturhinweise

Berg et al, Antimitochondrial antibodies in primary biliary cirrhosis and other disorders: Definition and clinical relevance, Dig Dis 1992; 10: 85 - 101

Stand: 27.03.2023