Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Faktor IX - Aktivität im Citrat-Blut

Klinische Indikation

Ein Mangel kann auf eine Hämophilie B hinweisen.

- Überwachung von Substitutionstherapie mit Faktor-IX-Konzentrat bei Hämophilie B,
- auffällige Blutungsprobleme
- ungewöhnlich stark verlängerte aPTT unter Antikoagulationstherapie mit Vitamin-K-Antagonisten bei INR im therapeutischen Bereich

Normalbereiche

Konventionell (KE): %

76 - 129	Erwachsene Kinder siehe Befundbericht

Sonstiges

Methode	KOAG
Synonyme	antihämophiles Globulin B
Störfaktoren	angeronnene Probe, mehrfaches Ein-Ausfrieren, falsches Mischungsverhältnis, Hämolyse, stark wirksame Lupus-Antikoagulanzien, Heparin und Hirudin als Kontamination bei hohen Plasmakonzentrationen, Lipämie und Hyperbilirubinämie bei sehr starker Ausprägung
Präanalytik	• kurzer venöser Stau • glatte Punktion • Blutentnahme ohne Stau • sofort schwenken • nicht schütteln • max. präanalytische Zeit 4 Stunden, kühl lagern Citratblut nach Entnahme innerhalb 1h zentrifugieren, Plasma abtrennen und einfrieren
Aufbewahrung	im Vollblut 4h bei Raumtemperatur, im Plasma bei Raumtemperatur 6h, -20°C im Plasma 1 Monat
Volumen	2 ml Citrat-Blut
Fremdleistung	ja

Stand: 12.01.2022