Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Glutamat-Oxalacetat-Transferase (GOT = ASAT) im Serum

Klinische Indikation

- Diagnostik und Verlaufskontrolle von Leber-, Gallenwegs-, Muskelerkrankungen
- Skelett-/Herzmuskelschäden
- Hämolyse

Normalbereiche

*International (SI): µmol/l*s*

0,17 - 0,58	Frauen
0,17 - 0,83	Männer
< 1,53	bis 1 Jahr
< 1,2	bis 3 Jahre
< 0,88	bis 6 Jahre
< 0,83	bis 12 Jahre
< 0,77	bis 16 Jahre

Konventionell (KE): U/l

10 - 35	Frauen
10 - 50	Männer
< 91,8	bis 1 Jahr
< 72	bis 3 Jahre
< 52,8	bis 6 Jahre
< 49,8	bis 12 Jahre
< 46,2	bis 17 Jahre

*Umrechnung: KE = SI * 60*

Sonstiges

Methode	KBR
Kurzbezeichnung	GOT
Synonyme	ASAT (Aspartat-Aminotransferase - AST)
Präanalytik	Serum bzw. Plasma ist innerhalb von 8 Stunden bei Raumtemperatur oder 3 Tage bei 2-8°C vom Blutkuchen abzutrennen.
Volumen	1 ml Serum

Stand: 25.09.2018