

Thrombozyten im EDTA-Blut

Klinische Indikation

- unklarer Blutungen
- Ausschluß von Blutungsneigungen
- Kontrolle von Bestrahlungen und von Chemotherapien
- Verdacht von Knochenmarkerkrankungen

Normalbereiche

International (SI): Gpt/l

150 - 400	Allgemein
217 - 497	bis 5 Jahre (männlich)
181 - 521	bis 10 Jahre (männlich)
156 - 408	bis 15 Jahre (männlich)
140 - 392	bis 20 Jahre (männlich)
229 - 553	bis 5 Jahre (weiblich)
184 - 488	bis 10 Jahre (weiblich)
154 - 422	bis 15 Jahre (weiblich)
154 - 386	bis 20 Jahre (weiblich)

Sonstiges

<i>Methode</i>	WhF
<i>Kurzbezeichnung</i>	THROMBO
<i>Synonyme</i>	Plättchen, Blutplättchen
<i>Störfaktoren</i>	Gerinnsel, Kälteagglutinine
<i>Präanalytik</i>	keine Besonderheiten
<i>Aufbewahrung</i>	Großes Blutbild 12h, Kleines Blutbild 1d
<i>Volumen</i>	3,5 ml EDTA-Blut

Stand: 8/13/2018