Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Bilirubin, gesamt im Serum

Klinische Indikation

Diagnose und Verlaufskontrolle von Leber- und Gallenwegserkrankungen sowie bei Erkrankungen mit gestörter Funktion der Erythrozyten (gestörter Erythrozytenstoffwechsel, gestörte Erythrozytenmorphologie, intravasale Hämolyse verschiedenster Genese).

V.a. Morbus hämolyticus neonatorum

Normalbereiche

International (SI): µmol/l

85,5	bis 1 Tag alt
145	bis 2 Tage alt
188	bis 3 Tage alt
214	bis 4 Tage alt
220	5-7 Tage alt

Konventionell (KE): mg/dl

< 1,0

*Umrechnung: KE = SI * 0,0585*

Sonstiges

Methode	FT
Störfaktoren	Licht/Sonne, Lipämie, Hämolyse, urämische Proben, einige Medikamente
Präanalytik	Probe Lichtgeschützt transportieren! Schnelle Zerstörung unter einer Lichtexposition. Blutabnahme nüchtern.
Aufbewahrung	Serum: 3 - 8°C 7 d , 2 d bei Raumtemperatur, eingefroren 6 Monate jeweils lichtgeschützt!
Volumen	1 ml

Stand: 29.03.2021