Leistungsverzeichnis

Beta-Crosslaps im EDTA-Plasma

Klinische Indikation

- Diagnostik / Screening von Osteoporose
- Beurteilung des Knochenstoffwechsels

Beurteilung

Der Referenzbereich gilt für eine Probe, die morgens zwischen 7:30-8:30Uhr beim nüchternen Patienten abgenommen wurde.
Dialysepatienten (normaler Knochenabbau): 0,5-2,1µg/l

Normalbereiche

Konventionell (KE): µg/l

24-<30Jahre	Männer:0,24-1,02 Frauen: 0,15-0,97
30-<40Jahre	Männer:0,23-0,94 Frauen: 0,15-0,64
40-<50Jahre	Männer:0,18-0,80 Frauen: 0,13-0,67
50-<60Jahre	Männer:0,16-0,74 Frauen: 0,18-1,01
60-<70Jahre	Männer:0,13-0,75 Frauen: 0,17-0,97
>70Jahre	Männer:0,12-0,78 Frauen: 0,15-0,86

Sonstiges

Methode	ECLIA
Kurzbezeichnung	CTX
Präanalytik	• Blutabnahme am nüchternen Patienten bis spätestens 8:30 Uhr (12h Nahrungskarenz) - strenge Nüchternabnahme: Patient darf **nur** Wasser trinken - es besteht eine erhebliche Tagesrhythmik • Bei Dialysepatienten geringe Tagesschwankungen
Volumen	0,5
Fremdleistung	ja

Stand: 19.01.2023