Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Allgemeine Erreger - Sepsis im Blutkultur

Klinische Indikation

- unklares Fieber (FUO)
- Tachypnoe
- Leukozytose Neutropenie
- PCT-/CRP-Erhöhung
- Pneumonie
- Endokarditis
- Osteomyelitis
- Pyelonephritis
- Meningitis
- chirurgische Wundinfektion
- intraabdominelle Infektion
- Gefäßkatheter-assoziierte Infektion

Beurteilung

Häufige Erreger:

- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus spp.*
- *Escherichia coli*
- *Enterococcus spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Pseudomonas spp.*

Ggf. Labormeldepflicht beachten (§ 7 IfSG)!

Sonstiges

Methode	KULT+MIKR
Synonyme	Sepsis
Präanalytik	Probenahme **schnellstmöglich vor Einleitung einer antimikrobiellen Therapie** bzw. unmittelbar vor der nächsten Antibiotika-Gabe Entnahmesystem: Blutkulturflaschen (aerob/anaerob bzw. Kinderflasche) • **mindestens 2 Blutkulturpaare** (aerobe/anaerobe Flasche) entnehmen • bei Säuglingen/Kleinkindern: 1 - 3 ml/Flasche • ggf. wiederholte Blutkultur-Abnahme
Aufbewahrung	Raumtemperatur (18 - 22 °C)
Volumen	3-10 ml/Flasche (Erw.) 1-3ml/Flasche (Kinder)

Stand: 09.10.2023