Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Candida spp. im Untersuchungsmaterial (verschieden)

Klinische Indikation

Verdacht auf Pilzinfektion (lokal/systemisch)

Beurteilung

bei Nachweis aus sterilen Körperregionen oder Wunden ist eine äthiologische Bedeutung anzunehmen, bei Nachweis aus physiologisch besiedelten Arealen (Nasen-Rachen-Raum, Urogenitaltrakt, Darm) ist eine (semiquantitative) Bestimmung anzustreben

Sonstiges

Methode	KULT
Kurzbezeichnung	CANDI
Synonyme	Hefen, Sprosspilze, Hefepilze, Candidiasis, Candidose
Präanalytik	Entnahmesystem: • steriles Gefäß • Urinröhrchen • eSwab-Abstrichtupfer Alternatives Untersuchungsmaterial: • respiratorisches Sekret (1-5 ml) • Urin (5 ml) • Sekret, Gewebe, Katheterspritze (soviel wie möglich)
Aufbewahrung	Kühlschrank (2 - 8 °C)
Volumen	5 ml

Literaturhinweise

IDSA Clinical Practice Guideline for the Management of Candidiasis: 2016 Uodate by the Infectious Diseases Society of America

Ruhnke et al, Diagnosis and therapy of Candida infections: joint recommandations of the German Speaking Mycological Society and the Paul-Ehrlich-Society for Chemotherapy, Mycoses 2011; 54: 279 - 310, auf deutsch bei AWMF als S1-Leitlinie

Suerbaum et al, Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 2016, S. 618 - 620

Stand: 24.11.2022