Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Glutamat-Pyruvat-Transaminase (GPT = ALAT) im Serum

Klinische Indikation

Diagnostik und Verlaufskontrolle von Leber- und Gallenwegserkrankungen.

Normalbereiche

International (SI): µmol/ls

0,17 - 0,58	Frauen
0,17 - 0,83	Männer
< 0,9	bis 1 Jahr
< 0,53	bis 3 Jahre
< 0,6	bis 6 Jahre
< 0,73	bis 12 Jahre
< 0,75	bis 17 Jahre

Konventionell (KE): U/l

10 - 35	Frauen
10 - 50	Männer
< 54	bis 1 Jahr
< 31,8	bis 3 Jahre
< 36	bis 6 Jahre
< 43,8	bis 12 Jahre
< 46	bis 17 Jahre

*Umrechnung: KE = SI * 60*

Sonstiges

Methode	CLIA
Kurzbezeichnung	GPT
Synonyme	ALAT, ALT, GPT,Alanin-Aminotransferase
Störfaktoren	Hämolyse, starke Lipämie, Ikterus
Präanalytik	Serum bzw. Plasma ist innerhalb von 8 Stunden bei Raumtemperatur oder 3 Tagen bei 2-8°C vom Blutkuchen abzutrennen.
Volumen	1 ml Serum

Stand: 25.09.2018