LABOR Schenk/Ansorge

# Hepatitis C - Gesamt-Antikörper (IgM + IgG) im Serum

## *Klinische Indikation*

- Verdacht auf eine Hepatitis - C-Infektion
- Übertragung parenteral

## *Beurteilung*

Das Vorhandensein von HCV-Antikörper ist ein Zeichen dafür, das eine Hepatitis C vorliegt (akut oder chronisch) oder durchgemacht wurde.

Bei einem positiven Suchtest erfolgt zur Bestätigung ggf. ein Hepatitis-C-Blot.

Es kann keine Aussage über die Infektiösität getroffen werden - HCV-PCR empfohlen.

## *Normalbereiche*

*Konventionell (KE): .*
negativ

## *Sonstiges*

| | |
|---|---|
| *Methode* | ECLIA |
| *Synonyme* | HCV, AHCV, Anti-HCV |
| *Störfaktoren* | Hämolyse, Lipämie |
| *Präanalytik* | keine Besonderheiten |
| *Häufigkeit der Bestimmung* | werktäglich |
| *Volumen* | 0,5 ml Serum |

## *Literaturhinweise*

Sarrazin et al, S3-Leitlinie Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-C-Virus (HCV)-Infektion 2016

Suerbaum et al, Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Springer 2016, S. 585 - 588

Stand: 09.04.2024