Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Lymphozyten im EDTA-Blut

Klinische Indikation

Verdacht auf

- Leukozytose
- Erkrankungen des Knochenmarks
- Infektionen
- Anämien

Normalbereiche

International (SI): Einheit in %

	bis Alter:
18 - 55	bis 2 Wochen
18 - 65	bis 6 Monate
18 - 60	bis 2 Jahre
13 - 55	bis 6 Jahre
13 - 50	bis 12 Jahre
13 - 45	bis 18 Jahre
17 - 47	ab 19 Jahre

Konventionell (KE): Absolutzellzahl in Gpt/l

	bis Alter:
3,0 - 7,5	bis 2 Wochen
2,0 - 8,0	bis 6 Monate
1,6 - 7,0	bis 2 Jahre
1,5 - 4,5	bis 6 Jahre
1,2 - 3,6	bis 12 Jahre
1,0 - 3,2	bis 18 Jahre
1,1 - 3,2	ab 19 Jahre (männlich)
1,2 - 3,6	ab 19 Jahre (weiblich)

Sonstiges

Störfaktoren	Gerinnsel
Präanalytik	keine Besonderheiten
Aufbewahrung	Grosses Blutbild 12h, Kleines Blutbild 1d bei Raumtemperatur
Volumen	3,5 ml EDTA-Blut

Literaturhinweise

Labor und Diagnose, Lothar Thomas, 8. Auflage, 2012

Stand: 13.08.2018