Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Dopamin im 24 Stunden-Sammelurin angesäuert

Klinische Indikation

- Phäochromozytom
- Neuroblastom
- Ganglioneurom
- arterielle Hypertonie

Normalbereiche

Konventionell (KE): µg/d
< 450,0

Sonstiges

Methode	HPLC
Synonyme	Katecholamine
Präanalytik	Die Bestimmung kann nur aus **angesäuertem** 24h-Urin erfolgen. Die entsprechenden Behälter mit Säurezusatz können in unserem Labor bestellt werden. **Mindestens 3 Tage vor Beginn und während des Sammelns** muß auf den Genuß folgender Nahrungsmittel und Getränke verzichtete werden: • Nikotin, koffeinhaltige Getränke, Tee, Nüsse, Bananen, Käse, Kakao, Mandeln, Vanille, Zwetschgen, Pflaumen, Tomaten, Stachelbeeren, Ananas, Auberginen, Avocados, Johannisbeeren, Melonen, Mirabellen • Medikamente: mit dem Wirkstoff Paracetamol sollten 2 Tage vorher nicht mehr eingenommen werden, phenothiazinhaltige Medikamente, Antirheumatika (Gentisinsäure- oder Homogentisinsäurehaltige Med.) Urin **gekühlt und lichtgeschützt** lagern!
Aufbewahrung	2 - 8 °C
Häufigkeit der Bestimmung	1x wöchentlich
Volumen	10 ml 24h-Urin

Stand: 17.01.2020