

## Allgemeine Erreger - sonstiges im Untersuchungsmaterial (verschieden)

### *Klinische Indikation*

---

Verdacht auf bakterielle Infektion der Haut, Weichteile, Muskulatur, Knochen, Gelenke usw.  
Bei Verdacht auf periprothetische Infektionen, Langzeitbebrütung über 14 Tage.

### *Beurteilung*

---

Der Nachweis bakterieller Entzündungserreger in normalerweise sterilen Bereichen ist ein Hinweis auf eine Infektion. In physiologisch unsterilen Regionen (Magen-Darm-Trakt, Urogenitaltrakt, Haut) ist die Quantität des Erregers sowie seine Pathogenität von Bedeutung. Von relevanten Erregern wird ein Resistogramm erstellt.

### *Sonstiges*

---

*Methode*

KULT

*Synonyme*

Bakterielle Erreger und Resistenz

Entnahmesystem: steriles Gefäß, eSwab-Abstrichtupfer

Alternatives Untersuchungsmaterial:

- Sekret/Exkret
- Punktat
- Gewebe
- Katheterspitze

*Präanalytik*

**Spezifische Infektionsdiagnostik (GO, TBC, Aktinomykose, Diphtherie, Pertussis usw.) muss gesondert angefordert werden!**

*Aufbewahrung*

Raumtemperatur (18 - 22 °C)

*Volumen*

so viel wie möglich

Stand: 11/23/2022

2/13/2025 / 12:54 AM