Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Troponin I, kardiales im Serum

Klinische Indikation

Die Bestimmung von kardialem Troponin I hilft bei der Diagnose akuter Myokardinfarkte sowie der Risikostratifizierung von Patienten mit akuten Koronarsyndromen ohne ST-Hebung hinsichtlich der Beurteilung des rel. Mortalitätsrisikos, des Risikos eines Myokardinfarktes oder der erhöhten Wahrscheinlichkeit ischämischer Ereignisse, die Maßnahmen zur sofortigen Reperfusion erforderlich machen.

Beurteilung

Erhöhte Werte:
- akuter/subakuter Myocardinfakt
- instabile Angina pectoris
- Herzmuselläsionen (z.B. Kontusion, OP)
- Kardiomyopathien mit Herzmuskelschädigung
- Karditis

Normalbereiche

Konventionell (KE): ng/ml
< 1,5

Sonstiges

Methode	EIA
Kurzbezeichnung	TROPI
Synonyme	Herzmuskelspezifisches Protein
Präanalytik	keine
Aufbewahrung	+2 - +8°C 24 Stunden, -20°C ein Monat
Häufigkeit der Bestimmung	sofort
Volumen	1 ml

Stand: 04.07.2018