Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Quick im Citrat-Blut

Klinische Indikation

Suchtest beim Verdacht auf plasmatische Gerinnungsstörung, Überwachung der Therapie mit Vitamin K-Antagonisten (z.B. Marcumar, Falithrom ect.), Verlaufskontrolle bei Vitamin-K-Mangelzuständen.

INR: International Normalized Ratio
Der INR - Wert ist zur Führung der eingestellten Patienten (orale Antikoagulazientherapie) geeignet, weniger zur Einstellung selber.
Der INR- Wert wird unaufgefordert zusätzlich zum Quick - Wert mitgeliefert.

Beurteilung

Ursache für einen erniedrigten Quickwert:

- Antikoagulantientherapie mit Cumarinderivaten (Marcumar)
- Lebererkrankungen (Hepatitis, Zirrhose)
- Vitamin K- Mangel
- angeborener Faktor Mangel (II, V, VII, X)

Normalbereiche

Konventionell (KE): .

Quick:	> 70 %
INR:	1,2 - 0,9

Sonstiges

Methode	CLOT
Synonyme	TPZ,Prothrombin - Thromboplastinzeit
Störfaktoren	Lipämie, Gerinnsel, Medikamente
Aufbewahrung	4 h bei 20-25°C im Vollblut oder Plasma, Plasma bei -20°C 1 Monat stabil
Volumen	1 ml Citrat-Blut

Stand: 25.03.2020