Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Hepatitis B - Anti-HBe im Serum

Klinische Indikation

Antikörper gegen das e - Antigen.

- Prüfung des Serums auf Infektiosität
- Verlaufskontrolle der akuten und chron. Hepatitis B
- Prüfung des Erfolgs einer antiviralen Therapie

Der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod durch eine akute Virushepatitis ist meldepflichtig!

Beurteilung

Antikörper gegen das e - Antigen. Tritt in der Rekonvaleszenz auf und weist mit Einschränkung auf eine nicht vorhandene oder nur geringe Infektiosität des Trägers hin.

Normalbereiche

Konventionell (KE): .
negativ

Sonstiges

Methode	CLIA
Störfaktoren	Bei Therapie mit hohen Biotin-Dosen >5mg/Tag sollte die Proben-Abnahme mind. 8 Stunden nach der letzten Applikation erfolgen. In seltenen Einzelfällen können Störungen durch extrem hohe Titer von Ak gegen Streptavidin auftreten.
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	0,5 ml Serum

Literaturhinweise

Comberg et al, Aktualisierung der S3-leitlinie zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-B-Virusinfektion, Zeitschrift für Gastroenterologie 2011; 49: 871 - 930

Stand: 09.04.2024