Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Hepatitis B - Anti-HBs im Serum

Klinische Indikation

- V. a. Hepatitis B
- Impftiter-Überprüfung

Der Verdacht einer Erkrankung, die Erkrankung sowie der Tod durch eine akute Virushepatitis ist meldepflichtig!

Beurteilung

Anti-HBs kann nach einer Hepatitis-B Infektion oder nach einer Hepatitis-B Impfung gebildet werden.

Dient zur Überprüfung der Notwendigkeit einer Impfung und zu deren Erfolgskontrolle, sowie Verlaufskontrolle nach einer akuten Hepatitis B.

Normalbereiche

Konventionell (KE): IU/l
< 10

Sonstiges

Methode	CLIA
Störfaktoren	Patienten unter hohen Biotin-Dosen, hohe Titer von Ak gegen Streptavidin. Bei Patienten, die mit monoklonalen Maus-Ak therapiert werden, können falsche Ergebnisse auftreten.
Präanalytik	Keine Besonderheiten. Vorangegangene Hepatitis-B-Impfungen bitte angeben.
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	0,5 ml Serum

Literaturhinweise

Comberg et al, Aktualisierung der S3-leitlinie zur Prophylaxe, Diagnostik und Therapie der Hepatitis-B-Virusinfektion, Zeitschrift für Gastroenterologie 2011; 49: 871 - 930