Leistungsverzeichnis

LABOR Schenk/Ansorge

Albumin im Serum

Klinische Indikation

- Verlaufsbeurteilung akuter Lebererkrankungen und Leberzirrhose und Nierenerkrankungen
- Verdacht auf erniedrigte Gesamteiweißkonzentration
- Abklärung von Oedemen
- Abklärung des Ernährungsstatus (u.a. bei alten Menschen, chron. Kranken)

Beurteilung

Erhöhte Werte:

- Exsikkose
- Hämokonzentrierung

Erniedrigte Werte:

- Mangelernährung und Malabsorption
- gastrointestinaler Proteinverlust (z.B. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, glutensensitive Enteropathie (Sprue/Zöliakie), chron. Pankreatitis)
- nephrotisches Syndrom
- Verbrennungen
- Schwangerschaft
- Medikamenteneinnahme (Phenytoin, Salizylsäure bei Niereninsuffizienz)

Normalbereiche

International (SI): g/l

35,0 - 52,0	Erwachsene
siehe Befundbericht	Kinder

Konventionell (KE): g/dl

3,5 - 5,2	Erwachsene
siehe Befundbericht	Kinder

*Umrechnung: KE = SI * 0,1*

Sonstiges

Methode	NIA
Präanalytik	keine Besonderheiten
Häufigkeit der Bestimmung	werktäglich
Volumen	0,5 ml Serum

Stand: 11.04.2024