

## Allgemeine Erreger - Meningitis im Liquor

### *Klinische Indikation*

---

- Kopfschmerzen
- Meningismus
- Fieber
- Nausea
- Ernesis
- Photophobie
- gestörte Vigilanz

### *Beurteilung*

---

**Ggf. Arzt- und Labormeldepflicht beachten (§§ 6, 7 IfSG)!**

#### Häufige Erreger:

- *Streptococcus pneumoniae*
- *Neisseria meningitidis*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus sp.*
- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae*
- *Streptococcus agalactiae* (Neugeborene)

#### **Meningitis-Erreger (Multiplex-PCR) nicht akkreditiert:**

- Cytomegalie-Virus (CMV)
- Herpes-simplex-Virus I,II
- Varizella-Zoster-Virus (VZV)
- Epstein-Barr-Virus (EBV)
- Enterovirus
- Mumpsvirus
- Parechovirus
- Humanes Herpes-Virus 6
- Humanes Herpes-Virus 7
- Parvovirus B19
- Adenovirus

#### **Bakterien:**

- *Haemophilus influenzae*
- *Neisseria meningitidis*
- *Streptococcus pneumoniae*
- Steptokokken Gruppe B
- *Listeria monocytogenes*
- *Escherichia coli K1*

### *Sonstiges*

---

<i>Methode</i>	KULT+PCR+MIKR
<i>Synonyme</i>	Meningiserreger
<i>Präanalytik</i>	<u>Entnahmesystem:</u> steriles Gefäß
<i>Aufbewahrung</i>	Raumtemperatur (18-22°C)
<i>Volumen</i>	5 ml

